

慈濟科技大學112學年各醫療院所實習體檢相關規定

縣市	實習院所	體檢報告	A肝抗體	B型肝炎抗原	B型肝炎抗體	C肝抗體	水痘抗體	麻疹抗體	德國麻疹抗體	腮腺炎	梅毒	胸部X光	其他規定
花蓮縣	花蓮縣衛生局			◎	◎							一年內	COVID-19 疫苗接種滿兩劑並提供接種記錄證明
花蓮縣	國軍花蓮總醫院	◎		◎	◎							◎	
花蓮縣	門諾壽豐分院			◎									
花蓮市	花蓮慈濟醫院	◎		◎	◎		◎	◎	◎			◎	B型肝炎抗體為陰性則需檢附施打第一劑疫苗注射證明，而曾完成三劑疫苗注射，但二個月後未產生抗體者，須追加一劑之證明。 實習達3個月以上檢附MMR接種證明或抗體報告。
花蓮市	衛生福利部花蓮醫院			◎								◎	
花蓮市	門諾醫院	◎		◎	◎	◎	◎	◎	◎			一年內	不具抗體者，需檢附疫苗注射完成證明。
台北市	臺安醫院	◎	◎	◎	◎			五年內報告	五年內報告	五年內報告		3個月	不具抗體者需檢具B型肝炎疫苗注射完成證明或已具B型肝炎抗體檢驗證明。
新北市	台北慈濟醫院	◎		◎	◎		◎	◎	◎			一年內	一年內之B型肝炎、胸部X光攝影檢查報告結果及水痘與麻疹抗體檢驗報告(若水痘與麻疹抗體檢驗報告結果為陰性則需同步提供MMR及水痘施打證明，若為陽性則提供檢驗報告即可) COVID-19疫苗接種記錄證明或提供陰性篩檢報告
新北市	汐止國泰綜合醫院	◎		◎	◎							3個月內	實習3個月以上(含)，另應提供一年內麻疹及德國麻疹IgG抗體檢驗，為陰性者建議施打MMR疫苗並另附證明 健檢報告同意書，COVID-19疫苗注射證明
台中市	台中慈濟醫院	◎		◎	◎			◎	◎			◎	B型肝炎抗體為陰性則需檢附施打第一劑疫苗注射證明，而曾完成三劑疫苗注射，但二個月後未產生抗體者，須追加一劑之證明。
嘉義縣	大林慈濟醫院	◎		◎	◎			◎	◎			一年內	
台東市	台東馬偕紀念醫院	◎		◎	◎			◎	◎			三個月內	不具抗體者需檢具B型肝炎疫苗注射完成證明或已具B型肝炎抗體檢驗證明，至婦兒實習需施打Tdap(減量破傷風白喉非細胞性百日咳混合疫苗)體檢報告的抗體皆須為三個月內的證明
宜蘭縣	羅東博愛醫院			◎	◎								不具抗體者需檢具B型肝炎疫苗注射完成證明或已具B型肝炎抗體檢驗證明。
花蓮縣	衛生福利部玉里醫院	◎		◎	◎							◎	
花蓮縣	衛生福利部東區老人之家			◎								◎	
台北市	臺北榮民總醫院			◎	◎		◎	◎	◎			三個月內	不具抗體者需檢具B型肝炎疫苗注射完成證明或已具B型肝炎抗體檢驗證明。
新北市	衛生福利部雙和醫院	◎		◎	◎			◎	◎		◎	◎	B型肝炎抗體及MMR為陰性則需檢附施打疫苗注射證明。
台東市	台東基督教醫院	◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎			一年內	抗體檢測效價不足者應接受疫苗施打，並檢附疫苗施打證明，未依規定完成者，本院有權暫停該生(見)實習課程，護理產兒科實習學生需加驗麻疹抗體及德國麻疹抗體。
彰化市	彰化基督教醫院	◎		◎	◎		◎	◎	◎			◎	抗體檢測效價不足者應接受疫苗施打，並檢附疫苗施打證明，未依規定完成者，本院有權暫停該生(見)實習課程。
彰化市	秀傳紀念醫院	◎		◎	◎		◎	◎	◎			◎	
台中市	臺中榮民總醫院	◎		◎	◎							三個月內	不具抗體者需檢具B型肝炎疫苗注射完成證明或已具B型肝炎抗體檢驗證明。